MAGASIN

DE

ZOOLOGIE,

D'ANATOMIE COMPARÉE

ET

DE PALÆONTOLOGIE,

RECUEIL

DESTINÉ A FACILITER AUX ZOOLOGISTES DE TOUS LES PAYS LES MOYENS DE PUBLIER LEURS TRAVAUX, LES ESPÈCES NOUVELLES QU'ILS POSSÈDENT, ET A LES TENIR SURTOUT AU COURANT DES NOUVELLES DÉCOUVERTES ET DES PROGRÈS DE LA SCIENCE,

par M. F.-E. Guérin-Méneville.

DEUXIÈME SÉRIE. — QUATRIÈME ANNÉE.

ANNÉE 1842.

PARIS,

Mme Ve ARTHUS BERTRAND, LIBRAIRE,

ÉDITEUR DES NOUVELLES ANNALES DES VOYAGES,

23, RUE HAUTEFEUILLE.

1842.

		Planches.
Phacellus Latreillei et Dejeanii	1839.	5.
Phoedinus Debauvei	1840.	31.
— lanio	1840.	30.
— microthorax	1840.	32.
Phricodus histrix	1840.	40.
Pieris enarete et ega	1839.	18.
Polyblastus Drewseni et alternans	1839.	8.
— palæmon	1839.	7.
Procris melas et viridi-pulverulenta	1839.	11.
Pterelachisus Berteii	1842.	106.
Rhisotrogus dispar	1841.	72.
Saperda cinerea	1841.	74.
Saturnia Laplacei	1839.	24 et 25.
Satyrus Coctei	1839.	11.
— Montrolii	1839.	20.
— singa et philerope	1839.	19.
Scarabæus Jupiter	1840.	46.
Seminota Leprieurii	1840.	41.
Smilia bifoliata	1841.	83.
Spheniscus ferrum equinum	1839.	4.
Sphinx Annei	1839.	2.
Sphoenognathus Feisthamelii	1840.	39.
— prionoides	1839.	1.
Stemmoderus singularis	1842.	91.
Stenaspis unicolor	1840.	38.
— rimosus	1841.	66.
Stiphylus quadripunctatus	1841.	63.
Systropus Eumenoides (monogr.)	1842.	90.
Sytaris rufipes	1841.	73.
Tesserocerus insignis	1839.	3.
Thynnides (matériaux sur les)	1842.	99 à 105.
Tmesidera rufipennis	1841.	85.
Trachyderes badius	1840.	36.
— blandus	1840.	35.
— juvencus	1840.	34.
Trigonalis Hahnii	1840.	53.

ZOOPHYTES.

Gemmipora fungiformis	1840.	2.
Laminopora contorta	1842	3.
Lichenopora glomerata	1840.	1.
Myriapora gracilis	1842.	4.

G. LAMINOPORE. Laminopora. *Michelin.*

L. crispée. *L. contorta.* Michelin.

L. fixa, ramosa, subcompressa; ramulis lamellosis, brevibus, divaricatis, contortis, raro coalitis; extremitatibus undulatis, porosissimis; poris utraque superficie, terminalibus, subrotundis, sæpe obstructis; colore fuscante.

Hauteur, 8 centimètres.

Habite.....

Ce Polypier, assez rare dans les collections, nous a paru devoir former un genre et prendre place à côté de celui Myriapore de M. de Blainville. Il se fait remarquer par le contournement de sa tige et de ses rameaux. Ces derniers, dans leur jeune âge, sont très aplatis et ondulés. Les pores, se remplissant en vieillissant et laissant peu de traces, ne se distinguent bien qu'à l'extrémité des rameaux. La couleur générale varie du gris au brun.

Ma collection.

H. MICHELIN.

G. MYRIAPORE. Myriapora. *De Blainville.*

M. grêle. *M. gracilis.* Michelin.

M. ramosa, dichotoma, albida ; ramis gracilibus, elongatis, irregulariter inflatis, teretibus ; extremitatibus truncatis, rotundatis ; poribus ramorum quincuncialibus, illi extremitatum glomeratis.

Hauteur, 10 centimètres.

Cette espèce, qui habite la mer Méditerranée, d'après M. Costa, professeur de zoologie à l'université de Naples, est remarquable par ses rameaux élancés et renflés dans les endroits où les pores sont les plus abondants. Les extrémités des rameaux affectent une forme arrondie, tandis que, dans la *Myriapora truncata* (*Millepora truncata*, Lmck., n° 5), elles sont terminées presque horizontalement.

Ma collection.

H. MICHELIN.



Laminopora *contorta*, *Michelin*.

Myriapora *gracilis*, Michelin.

G. Prêtre, del.

N. Rémond imp.

Annedouche sc